



Rapport des résultats nationaux Annexe à la synthèse

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins en psychiatrie en hospitalisation à temps plein (PSY)

Campagne 2024



12/12/2024

Sommaire



1. Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie
2. Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie
3. Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie
4. Annexes
 - Comment lire les résultats nationaux des indicateurs issus des dossiers patients ?
 - Comment lire un graphique en radar ?



1

Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

L'identification systématique des conduites addictives, chez les patients présentant des troubles psychiatriques sévères, en raison des conséquences de la comorbidité, et leur prise en charge est recommandée.

Cela consiste, notamment, en une évaluation de la consommation et une aide à l'arrêt des addictions.

Pour l'indicateur, ont été retenus le tabac, l'alcool et le cannabis. Pour chaque toxique, la recherche de l'addiction doit être évaluée et si elle est présente, une proposition de prise en charge doit être effectuée.

L'indicateur qui suit cette pratique, est composé de 3 critères sur le repérage et la proposition d'arrêt :

- du tabac ;
- de l'alcool ;
- du cannabis.

C'est la deuxième mesure nationale obligatoire sur ce thème en psychiatrie.

Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Résultats nationaux - données 2023

Score moyen national pondéré

65 /100

+10.6 points / 2021

42 % des établissements de santé

ont atteint un niveau satisfaisant



433 établissements de santé inclus
dans le calcul de la moyenne
0 établissement de santé non répondant




29 658
dossiers analysés

Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)

Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Résultat décomposé



- Critère 1 :** Repérage et proposition d'une stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction de la consommation de tabac (si patient fumeur)
- Critère 2 :** Repérage et proposition d'une stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction de la consommation d'alcool (si consommation à risque)
- Critère 3 :** Repérage et proposition d'une stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction de la consommation de cannabis (si consommation)



2

Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie



La prise en charge somatique, notamment de la maladie cardio-vasculaire, des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique est recommandée pour tout patient hospitalisé.

L'évaluation cardio-vasculaire et métabolique doit être réalisée à chaque séjour d'hospitalisation à temps plein par les professionnels de santé de l'établissement de santé prenant en charge le patient adulte, pour améliorer la prévention des maladies cardio-vasculaires et réduire la morbi mortalité de cette population.

Cet indicateur est composé de 6 critères :

- Antécédents cardiovasculaires et métaboliques personnels;
- Facteurs de risques thrombo-emboliques ;
- Mesure de la pression artérielle;
- Mesure des paramètres anthropométriques ;
- Conclusion médicale vis-à-vis d'un électrocardiogramme;
- Résultats vis-à-vis des examens sanguins

C'est la deuxième mesure nationale obligatoire sur ce thème en psychiatrie.

Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie



Résultats nationaux - données 2023

Score moyen national pondéré

69/100

+9 points / 2021

37 % des établissements de santé

ont atteint un niveau satisfaisant



433 établissements de santé inclus
dans le calcul de la moyenne
0 établissement de santé non répondant



29 658
dossiers analysés


Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)

Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie



Résultat décomposé



Critère 1 : Antécédents cardiovasculaires et métaboliques personnels

Critère 2 : Facteurs de risque thrombo-embolique

Critère 3 : Mesure de la pression artérielle

Critère 4 : Mesures des paramètres anthropométriques

Critère 5 : Conclusion médicale vis-à-vis d'un électrocardiogramme

Critère 6 : Résultats vis-à-vis des examens sanguins



3

Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie



Les recommandations de la Fédération Française de Psychiatrie pour l'amélioration de la prise en charge somatique des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique soulignent le risque de survenue de pathologies somatiques chez ces patients, pouvant être d'origine iatrogénique et liées à des effets indésirables des traitements.

La consommation de psychotropes, et plus particulièrement des antipsychotiques, peut entraîner des troubles du transit (constipation, fécalome, occlusion intestinale...) et des troubles de la déglutition (liées à des dyskinésies oro-faciales). Ces troubles peuvent également survenir à distance de la mise en œuvre d'un traitement.

Un travail de prévention est donc nécessaire pour tout patient hospitalisé, avec une recherche active des troubles du transit et de la déglutition afin de réduire les risques liés à la prise de traitement.

L'indicateur présenté sous la forme :

- d'un taux de conformité, évalue le taux de séjours de patients adultes pour lesquels il est retrouvé une mention dans les 7 jours après l'admission
- d'une évaluation du transit intestinal

ET

- d'une évaluation de la déglutition.

C'est la deuxième mesure nationale obligatoire sur ce thème en psychiatrie.



Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Résultats nationaux - données 2023

Moyenne nationale pondérée

46 %

+17.5 points / 2021

35 %

des établissements de santé
ont atteint un niveau satisfaisant



440 établissements de santé inclus
dans le calcul de la moyenne
0 établissement de santé non répondant



21 601
dossiers analysés

Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)



4

Annexes

Comment lire les résultats

- Comment lire les résultats nationaux des indicateurs issus des dossiers patients ?
- Comment lire un graphique en radar ?



Comment lire les résultats nationaux issus des dossiers patients ?

L'indicateur est

- un score sur 100 calculé à partir de plusieurs critères ou dimensions,
- ou un taux (%)

Les établissements ont atteint un niveau satisfaisant ou ont les meilleurs résultats. Ce sont ceux classés A ou B pour l'indicateur

Score moyen national pondéré

N/100

N % des établissements
ont atteint un niveau satisfaisant

 **N** établissements de santé
inclus dans le calcul de la moyenne

 **N**
dossiers analysés

Nombre d'établissements
pour lequel l'indicateur
est calculé

Liens vers
plus de détails

Nombre total de dossiers
ou de questionnaires analysés

Explication : [Fiche descriptive](#)


Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins – résultats nationaux 2024 en Psychiatrie



Comment lire un graphique en radar ?

Pour chaque indicateur correspondant à un score, un graphique en radar présente le résultat des éléments (critères ou dimensions) entrant dans le calcul du score.



Échelle du graphique

Critère ou dimension composant l'indicateur



[Retour aux résultats](#)
- [Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions](#)

- [Évaluation cardio-vasculaire et métabolique](#)

Critère 1 : Repérage et proposition d'une stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction de la consommation de tabac (si patient fumeur)

Critère 2 : Repérage et proposition d'une stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction de la consommation d'alcool (si consommation à risque)

Critère 3 : Repérage et proposition d'une stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction de la consommation de cannabis (si consommation)

Valeur du critère ou de la dimension



Retrouvez
tous nos travaux sur

www.has-sante.fr



Pour en savoir plus : [Mieux connaître les indicateurs](#)

Contact : contact.iqss@has-sante.fr

